

営農振興課からのお知らせ

タイトル オオタバコガの被害に注意

キャベツや白菜で被害が拡大しています。早めの防除が重要です。

1 見分け方

- (1) 幼虫の節々に、まばらに毛が生えているのが特徴です。
- (2) 幼虫の色は、緑色と褐色の2種類います。
- (3) ハクサイやキャベツ等、結球内部に幼虫が入っていることが多く、出荷時に注意が必要（食入孔がある）です。
- (4) 夏から秋にかけて、高温少雨が続くと多発する傾向があります。



オオタバコガの幼虫

2 被害のようす

- (1) 幼虫は外葉、結球部とも加害します。
- (2) 中齢までの幼虫は葉の表面を荒く食害し、それ以降は不整形に穴をあけ食害します。（結球内部への食入を開始します）
- (3) 集団で食害することではなく、多発生のときでも株当たり0.5頭程度です。

3 防除

- (1) 初期発生を見逃さないようは場の見回りを行ってください。
重点防除時期 9/5～9/15・9/25～10/5 の頃です。
- (2) 野菜の体内に食入する前に防除してください。

作物名	農薬名	使用時期	使用倍率	使用回数
キャベツ	プレバソンフロアブル5	収穫前日まで	2000	3回以内
	コテツフロアブル	収穫前日まで	2000	2回以内
	フェニクス顆粒水和剤	収穫前日まで	2000~4000	3回以内
	アニキ乳剤	収穫3日前まで	1000~2000	3回以内
	プレオフロアブル	収穫7日前まで	1000	2回以内
ハクサイ	フェニクス顆粒水和剤	収穫前日まで	2000~4000	3回以内
	アニキ乳剤	収穫3日前まで	1000~2000	3回以内
	プレオフロアブル	収穫7日前まで	1000	2回以内
ブロッコリー	アフーム乳剤	収穫3日前まで	1000~2000	3回以内
	ディアナSC	収穫前日まで	2500~5000	2回以内
レタス	コテツフロアブル	収穫前日まで	2000	2回以内
	プレバソンフロアブル5	収穫前日まで	2000	3回以内
	アニキ乳剤	収穫3日前まで	1000~2000	3回以内

平成28年8月3日現在の農薬登録情報に基づいています。